Комплексное удобрение для рапса

Озимый и яровой рапс — культура очень требовательная к условиям минерального питания и чувствительная к недостатку ряда микроэлементов. Интенсивное поглощение питательных веществ рапсом происходит от начала стеблевания до завершения цветения. Особенно критичным для рапса является дефицит бора и марганца на ранних стадиях развития. Важную роль в оптимизации питания культуры вносят такие элементы, как сера и магний. Учитывая физиологические потребности данной культуры, компания «Грин Лифт» разработала сбалансированную подкормку для рапса в критические фазы жизненного цикла.

1. **Сбалансированный состав,** полностью отвечающий питательным требованиям культуры.
2. **Свободные L-аминокислоты** для активного усвоения элементов питания и защиты от стрессов.
3. **Высокое содержание серы** для более эффективного азотного питания и качественного урожая.
4. **Оптимальный баланс бора и марганца** — ключевых элементов в питании культуры.
5. **Специальный прилипатель** для равномерного покрытия листьев и пролонгированного внекорневого питания растений.

Содержание элементов не менее, г/л													
N (общий)	P_2O_5	K_2O	SO_3	MgO	Mn*	Si	Zn*	Fe*	Cu*	B	Mo*	Co*	Se
35	12.9	11.4	150	24.5	16	9.3	5.7	3	2.7	2.4	0.2	0.1	0.01

* микроэлементы в аминохелатной форме

- Свободные L-аминокислоты (аргинин, лизин, метионин, треонин, глицин, серин, аланин) — 25 г/л.
- Экстракт бурых морских водорослей (Laminaria).
- Полисахариды.
- Органические кислоты (янтарная и лимонная).
- Прилипатель (ПАВ).
- Трансмембранные вещества.
- Буфер pH.

- Активирует рост листьев, боковых побегов весной, активный фотосинтез
- Стимулирует развитие сильной корневой шейки рапса
- Повышает зимостойкость озимого рапса, укрепляет растения после зимовки
- Повышает урожайность, масличность семян
- Усиливает иммунитет растений в условиях засухи, весенних заморозков
- Улучшает фертильность пыльцы, способствует равномерному созреванию семян
- Сочетается с обработкой гербицидами, снижая их стрессовое воздействие

Сельскохозяйственная культура	Норма расхода	Фенофазы развития культур
Рапс озимый	1–2 л/га, расход рабочего раствора 100–300 л	1. Образование листовой розетки (осень) 2. Возобновление вегетации (весна) 3. Бутонизация
Рапс яровой		1. Розетка листьев (весна) 2. Бутонизация — начало цветения

Окончательное решение по выбору фазы и нормы внесения удобрения принимает специалист предприятия на основании данных листовой и почвенной диагностики, состояния растений, технологии выращивания культур в хозяйстве и планируемой урожайности.