# Комплексное удобрение для зернобобовых

Зернобобовые культуры известны своей способностью к симбиозу с азотфиксирующими (клубеньковыми) бактериями. Важную роль в жизнедеятельности клубеньковых бактерий играют микроэлементы, особенно бор и молибден. Компания «Грин Лифт» разработала сбалансированную комплексную подкормку с учётом потребностей и специфики питания зернобобовых культур.

1. **14 микро-, макро- и мезоэлементов, а также сбалансированный комплекс органических веществ.**
2. **Комплекс аминокислот — идеальное дополнение в борьбе со стрессовыми факторами.**
3. **Высокое содержание комбинации бора и молибдена для поддержки метаболизма азота.**
4. **Специальный прилипатель для удержания удобрения на поверхности листьев и исключения смывания дождём.**

Все продукты

| Содержание элементов не менее, г/л | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (общий) | $P_2O_5$ | $K_2O$ | $SO_3$ | MgO | Mn* | Si | Zn* | Fe* | Cu* | B | Mo* | Co* | Se |
| 35 | 12.9 | 11.4 | 112 | 24.5 | 11.4 | 9.3 | 5.7 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.01 |

* микроэлементы в аминохелатной форме

- Свободные L-аминокислоты (аргинин, лизин, метионин, треонин, глицин, серин, аланин) — 25 г/л.
- Экстракт бурых морских водорослей (Laminaria).
- Полисахариды.
- Органические кислоты (янтарная и лимонная).
- Прилипатель (ПАВ).
- Трансмембранные вещества.
- Буфер pH.

- Устраняет дефицит элементов питания в критические фазы
- Активирует процесс фиксации азота клубеньковыми бактериями
- Защищает от воздействия абиотических стрессов (засуха, переувлажнение и др.)
- Повышает крупность семян и содержание в них протеина
- Удовлетворяет потребности высокопродуктивных сортов зернобобовых культур в минеральном питании
- Совмещается с большинством СЗР в баковой смеси

| Сельскохозяйственная культура | Норма расхода | Фенофазы развития культур |
|---|---|---|
| Зернобобовые культуры (нут, горох, чечевица, люпин, фасоль, вика) | 1–2 л/га, расход рабочего раствора 100–300 л | 1. 3–4 настоящих листа<br>2. Бутонизация |
| Соя | | 1. Бутонизация<br>2. Образования бобов |

Окончательное решение по выбору фазы и нормы внесения удобрения принимает специалист предприятия на основании данных листовой и почвенной диагностики, состояния растений, технологии выращивания культур в хозяйстве и планируемой урожайности.